

راه های انتقال اچ ای وی / ایدز چیست؟

- ۱) خون و مایعات خونی (تماس با خون آلوده به هر شکلی که وارد بدن فرد دیگر شود)
 - ۲) تماس جنسی
 - ۳) از مادر مبتلا به اچ آی وی / ایدز در هنگام بارداری، زایمان و شیردهی
- اچ آی وی مخصوص گروه خاص نیست. اچ آی وی ایدز معمولاً تا ۱۰ سال هیچ علامتی ایجاد نمی کند.

راه هایی که اچ ای وی / ایدز از طریق آن منتقل نمی شود



همکاری با همکلاس بودن، استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی، هم غذا بودن، عطسه و سرفه، استخر، نیش حشرات بیماری را منتقل نمی کند. جداسازی افراد مبتلا خود سبب گسترش پنهانی بیماری در جامعه می شود.

راه اصلی کنترل اچ آی وی / ایدز:

اطلاع رسانی، پیشگیری، تشخیص زودهنگام، **درمان** و حمایت از مبتلایان

شناسایی سریع ابتلا و مصرف دارو ها می تواند از تعداد ویروس بکاهد و از انتقال به دیگران جلوگیری کند. در حال حاضر خدمات تشخیصی و داروهای اصلی برای آن در مراکز مشاوره بیماری ها در اختیار مبتلایان قرار می گیرد.

آدرس مرکز مشاوره بیماری های رفتاری و عفونی مرجع مشهد:

خیابان رسالت - نیش رسالت ۱۴ - جنب سیلو

تلفن تماس ۳۲۷۱۵۲۴۲

سایت ایدز دانشگاه علوم پزشکی مشهد: <http://aids.mums.ac.ir>

پست الکترونیک جهت پاسخگویی: aids@mums.ac.ir

همه ما باید نسبت به وضعیت
اچ ای وی خود اطلاع داشته باشیم



اچ ای وی یک بیماری عفونی قابل کنترل است. اغلب آنرا بعنوان ایدز می شناسند، در صورتی که ایدز آخرین مراحل عفونت اچ ای وی است و اگر فرد تحت مراقبت و درمان باشد، هرگز اتفاق نمی افتد.

تست سریع تشخیصی اچ ای وی در کمتر از ۲۰ دقیقه می تواند وضعیت احتمالی ابتلا را مشخص نماید. البته تا حدود سه ماه پس از آنکه ویروس وارد بدن فرد شد، ممکن است در آزمایش قابل تشخیص نباشد. معمولا تا ۱۰ سال از ظاهر فرد نمی توان ابتلای وی را تشخیص داد.

این تست در مراکز مشاوره به صورت کاملا رایگان و محرمانه صورت می پذیرد.

اچ ای وی مخصوص گروه خاصی نیست.

برای سلامتی خود، خانواده و جامعه آزمایش دهیم و در صورت ابتلا درمان

شویم تا تعداد ویروس در بدنمان کاهش یابد و انتقال صورت نگیرد.

آدرس مراکز مشاوره بیماری های رفتاری را، جهت انجام

آزمایش سریع اچ ای وی از تلفن ۳۲۷۱۵۲۴۲ یا ۱۱۸ پیرسید یا

از سایت <http://aids.mums.ac.ir> دریافت نمایید

